

UPUTSTVO ZA LEK

Ceftazidim, 1 g, prašak za rastvor za injekciju/infuziju

ceftazidim

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.
- Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.
- Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Ceftazidim i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Ceftazidim
3. Kako se primenjuje lek Ceftazidim
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Ceftazidim
6. Dodatne informacije

1. Šta je lek Ceftazidim i čemu je namenjen

Ceftazidim je antibiotik koji se primenjuje kod odraslih i dece (uključujući i novorođenčad). Deluje tako što ubija bakterije koje prouzrokuju infekcije. Ceftazidim pripada grupi lekova koji se nazivaju cefalosporini.

Ceftazidim se koristi za lečenje teških bakterijskih infekcija:

- pluća ili grudnog koša;
- pluća i bronhija kod pacijenata koji pate od cistične fibroze;
- moždanih ovojnica (*meningitis*);
- uha;
- urinarnog trakta;
- kože i mekih tkiva;
- trbuha i trbušnog zida (*peritonitis*);
- kostiju i zglobova.

Ceftazidim se, takođe, koristi:

- za prevenciju infekcija tokom hirurškog zahvata na prostati kod muškaraca;
- za lečenje pacijenata sa niskim brojem leukocita (*neutropenija*), koji imaju groznicu izazvanu nekom bakterijskom infekcijom.

2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Ceftazidim

Lek Ceftazidim ne smete primati:

- ako ste alergični (preosetljivi) na ceftazidim, na bilo koji antibiotik iz grupe cefalosporina ili na pomoćnu supstanцу leka (navedena u delu 6);
- ako ste imali tešku alergijsku reakciju na bilo koji antibiotik (peniciline, monobaktame i karbapeneme), jer postoji mogućnost da ste alergični i na Ceftazidim.

Razgovarajte sa svojim lekarom pre nego što počnete sa primenom leka, ukoliko se ovo odnosi na Vas. U tom slučaju ne smete primati lek Ceftazidim.

Upozorenja i mere opreza

Tokom terapije lekom Ceftazidim, posebno obratite pažnju na simptome kao što su alergijske reakcije, poremećaji nervnog sistema i gastrointestinalni poremećaji kao što je proliv. To će smanjiti rizike od mogućih problema. Videti poglavlje 4 - *Stanja koja zahtevaju oprez*. Ako ste imali neku alergijsku reakciju na druge antibiotike, postoji mogućnost da ste alergični i na lek Ceftazidim.

Ukoliko je potrebno da uradite analize krvi ili urina

Primena leka Ceftazidim može uticati na rezultat koncentracije šećera prilikom provere urina i na rezultate testa krvi koji se naziva *Coombs-ov test*. Ukoliko radite ove testove, obavestite osobu koja Vam uzima uzorak da ste na terapiji lekom Ceftazidim.

Drugi lekovi i Ceftazidim

Recite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste donedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Pre primene leka Ceftazidim, obavestite lekara ako uzimate neki od sledećih lekova:

- antibiotik *hloramfenikol*;
- aminoglikozidne antibiotike, npr. *gentamicin*, *tobramicin*;
- diuretik (tablete za izbacivanje tečnosti) *furosemid*.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Pre primene leka Ceftazidim, obavestite lekara:

- ako ste trudni, postoji mogućnost da ste trudni ili planirate trudnoću;
- ako dojite.

Vaš lekar će proceniti korist terapije lekom Ceftazidim u odnosu na moguće rizike po bebu.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Ceftazidim može izazvati neželjena dejstva (kao što je vrtoglavica) koja mogu uticati na sposobnost upravljanja vozilima. Nemojte upravljati vozilima i rukovati mašinama ako niste sigurni kako lek utiče na Vas.

Lek Ceftazidim sadrži natrijum-karbonat

Ovaj lek sadrži 2,17 mmol (50 mg) natrijuma po dozi. Savetuje se poseban oprez prilikom primene leka kod pacijenata koji su na dijeti u kojoj se kontroliše unos natrijuma (soli).

3. Kako se primenjuje lek Ceftazidim

Lek Ceftazidim po pravilu daje lekar ili medicinska sestra. Može se dati u obliku intravenske infuzije ili kao injekcija, direktno u venu ili u mišić.

Lek Ceftazidim priprema lekar, farmaceut ili medicinska sestra, koristeći vodu za injekcije ili pogodnu infuzionu tečnost.

Preporučena doza

Dozu leka Ceftazidim će Vam odrediti lekar, a ona zavisi od težine i vrste infekcije, od toga da li uzimate neke druge antibiotike, od Vaše telesne težine, starosti i funkcije bubrega.

Novorođenčad (0 - 2 meseca):

Po jednom kilogramu telesne mase bebe, biće primenjeno od 25 do 60 mg leka Ceftazidim dnevno, podeljeno u dve doze.

Odojčad (bebe uzrasta od 2 meseca) i deca sa telesnom masom manjom od 40 kg:

Po jednom kilogramu telesne mase bebe ili deteta, biće primenjeno od 100 do 150 mg leka Ceftazidim dnevno, podeljeno u tri doze. Maksimalna doza je 6 g dnevno.

Odrasli i adolescenti sa telesnom masom 40 kg i više:

1 do 2 g leka Ceftazidim, tri puta dnevno. Maksimalna doza je 9 g dnevno.

Pacijenti stariji od 65 godina:

Dnevna doza ne treba da bude veća od 3 g dnevno, posebno kod pacijenata starijih od 80 godina.

Pacijenti sa oštećenjem bubrega:

Lekar Vam može propisati dozu koja se razlikuje od uobičajene. On će odlučiti koliku dozu leka treba da primite u zavisnosti od težine oboljenja bubrega. Lekar će Vas detaljno pregledati i češće proveravati funkciju bubrega.

Ako ste primili više leka Ceftazidim nego što treba

Ovaj lek će Vam dati zdravstveni radnik. Međutim, ako mislite da ste primili veću dozu leka nego što je trebalo, recite to svom lekaru ili medicinskoj sestri.

Ako ste zaboravili da primite lek Ceftazidim

Ovaj lek će Vam dati neko od zdravstvenih radnika. Ako mislite da ste propustili dozu, recite to svom lekaru ili medicinskoj sestri. Ne treba da primite duplu dozu leka (dve injekcije odjednom) da biste nadoknadili propuštenu.

Ako naglo prestanete da primele lek Ceftazidim

Nemojte prekidati terapiju lekom Ceftazidim bez konsultacije sa lekarom.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se javlje kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Stanja koja zahtevaju oprez:

Sledeće ozbiljne neželjene reakcije se javljaju kod malog broja pacijenata, ali njihova prava učestalost nije poznata:

- ozbiljna alergijska reakcija čiji su simptomi osip i svrab po koži, ponekad oticanje mekih tkiva lica, usana i jezika, što dovodi do otežanog disanja;
- osip po koži, koji može biti praćen pojmom plikova, i može imati izgled malih meta (centralna tamna tačka okružena svetlijom površinom, sa tamnim krugom oko ivice);
- proširen osip sa plikovima i ljuštenjem kože (ovo mogu biti simptomi *Stivens-Johnson sindroma* ili *toksične epidermalne nekrolize*);
- poremećaji nervnog sistema: drhtavica (tremor), konvulzije i u nekim slučajevima, koma. Ovi simptomi se javljaju u slučaju da je primenjena prevelika doza, posebno kod osoba sa oboljenjem bubrega,
- teške reakcije preosetljivosti sa teškim osipom, koji može biti praćen groznicom, umorom, oticanjem lica ili limfnih žlezda, povećanjem eozinofila (vrsta belih krvnih zrnaca), dejstvima na jetru, bubrege ili pluća (DRESS sindrom).

Ako dođe do pojave nekog od ovih simptoma, odmah se obratite lekaru.

Česta neželjena dejstva (mogu da se javi kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

- proliv;
- zapaljenje vena ili zapaljenje vena sa stvaranjem ugrušaka krvi nakon intravenske primene;
- crveni osip po koži praćen svrabom, nalik koprivnjači;
- bol, peckanje, otok ili zapaljenje na mestu primene injekcije.

Recite svom lekaru ako se nešto od navedenog odnosi na Vas.

Česta neželjena dejstva koja se mogu uočiti na testovima krvi:

- porast broja jedne vrste leukocita (eozinofilija);
- porast broja ćelija koje pomažu zgrušavanju krvi;
- porast enzima jetre;
- pozitivan Coombs test.

Povremena neželjena dejstva (mogu da se javi kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

- zapaljenje creva koje može izazvati bol ili proliv uz prisustvo krvi;
- gljivične infekcije usne duplje ili vagine;
- glavobolja;
- vrtoglavica;
- bol u trbuhi;
- osećaj mučnine i povraćanje;
- svrab;
- grozница i jeza.

Recite svom lekaru ako se nešto od navedenog odnosi na Vas.

Povremena neželjena dejstva koja se mogu uočiti na testovima krvi:

- smanjen broj određene vrste belih krvnih zrnaca (neutropenijsa);
- smanjen broj belih krvnih zrnaca;
- smanjen broj trombocita (ćelije koje pomažu zgrušavanju krvi);
- porast koncentracije uree, azota iz uree ili kreatinina u krvi.

Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se javi kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

- zapaljenje ili gubitak funkcije bubrega (slabost bubrega).

Ostala neželjena dejstva

Ostala neželjena dejstva se javljaju kod malog broja pacijenata ali je njihova prava učestalost nepoznata:

- osećaj mravinjanja i bockanja;
- neprijatan ukus u ustima;
- žuta prebojenost beonjača ili kože.

Ostala neželjena dejstva koja se mogu uočiti na testovima krvi:

- anemija usled razgradnje crvenih krvnih zrnaca;
- porast određene vrste leukocita (bela krvna zrnca);
- izraženo smanjenje broja određene vrste belih krvnih zrnaca.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Ceftazidim

Čuvati lek van vidokruga i domaćaja dece.

Ne smete koristiti lek Ceftazidim posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem i unutrašnjem pakovanju nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Čuvati u originalnom pakovanju.

Lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.

Nakon rekonstitucije/razblaženja: upotrebiti odmah.

Dokazana je fizičko-hemijska stabilnost leka nakon rekonstitucije u roku od 24 sata nakon pripreme ukoliko se čuva pod navedenim uslovima i ukoliko je pripremljen uz pomoć nekog od navedenih rastvarača:

Rastvarač	Koncentracija rastvora	Uslovi
Voda za injekciju	70 mg/mL 280 mg/mL	24 sata na temperaturi $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 24 sata na temperaturi $5 \pm 3^{\circ}\text{C}$
0,5% lidokain-hidrohlorid rastvor za injekciju	260 mg/mL	24 sata na temperaturi $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 24 sata na temperaturi $5 \pm 3^{\circ}\text{C}$

1% lidokain-hidrohlorid rastvor za injekciju	280 mg/mL	24 sata na temperaturi 25 ± 2 °C 24 sata na temperaturi 5 ± 3 °C
Bakteriostatska voda za injekciju	250 mg/mL	24 sata na temperaturi 25 ± 2 °C 24 sata na temperaturi 5 ± 3 °C
0,9% rastvor natrijum-hlorida za injekcije	1 mg/mL 40 mg/mL 250 mg/mL	24 sata na temperaturi 25 ± 2 °C 24 sata na temperaturi 5 ± 3 °C
5% rastvor glukoze za injekcije	1 mg/mL 40 mg/mL	24 sata na temperaturi 25 ± 2 °C 24 sata na temperaturi 5 ± 3 °C

S mikrobiološke tačke gledišta rastvor treba odmah primeniti nakon pripreme za upotrebu. Ukoliko se odmah ne upotrebi, odgovornost za vreme i uslove čuvanja pre upotrebe preuzima korisnik i ne bi trebalo da bude duže od 24 sata na temperaturi 2 do 8 °C, osim ukoliko se rekonstitucija/razblaženje vrši pod kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Ceftazidim

Sadržaj aktivne supstance:

1 boćica praška za rastvor za injekciju/infuziju sadrži 1g ceftazidima, u obliku ceftazidim, pentahidrata.

Pomoćna supstanca je: natrijum-karbonat.

Kako izgleda lek Ceftazidim i sadržaj pakovanja

Prašak za rastvor za injekciju/infuziju.

Izgled:

Prašak bele ili bledožute boje.

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje gotovog leka:

Bezbojna staklena boćica (hidrolitičke otpornosti III) zapremine 10 mL, zatvorena čepom od brombutil gume, aluminijumskim prstenom i plastičnim poklopcem (*flip-off* zatvarač), koja sadrži 1 g ceftazidima u obliku ceftazidim, pentahidrata.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 boćica i uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Galenika a.d. Beograd

Batajnički drum b.b., Beograd

Republika Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jul, 2017.

Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi.

Broj i datum dozvole:

515-01-00488-17-001 od 20.07.2017.

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:

KLINIČKI PODACI

Terapijske indikacije

Lek Ceftazidim je indikovan za lečenje sledećih infekcija kod odraslih i dece, uključujući novorođenčad (od rođenja):

- Nozokomijalna pneumonija
- Bronhopulmonalne infekcije kod cistične fibroze
- Bakterijski meningitis
- Hronični supurativni *otitis media*
- Maligni *otitis externa*
- Komplikovane infekcije urinarnog trakta
- Komplikovane infekcije kože i mekih tkiva
- Komplikovane intraabdominalne infekcije
- Infekcije kostiju i zglobova
- Peritonitis povezan sa dijalizom kod pacijenata na kontinuiranoj ambulantnoj peritonealnoj dijalizi (eng. *Continuous ambulatory peritoneal dialysis, CAPD*).

Lečenje pacijenata sa bakterijemijom koja je povezana ili se sumnja da je povezana sa bilo kojom od gore navedenih infekcija.

Ceftazidim se može koristiti u terapiji pacijenata sa neutropenijom praćenom povišenom telesnom temperaturom, za koju se prepostavlja da se javlja usled bakterijske infekcije.

Ceftazidim se može primenjivati za perioperativnu profilaksu infekcija urinarnog trakta kod pacijenata koji se podvrgavaju transuretralnoj resekciji prostate (TURP).

Prilikom odabira ceftazidima treba uzeti u obzir njegov antibakterijski spektar, koji je uglavnom ograničen na aerobne gram-negativne bakterije (videti odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i 5.1 Sažetka karakteristika leka).

Ceftazidim treba primenjivati istovremeno sa drugim antibakterijskim lekovima kad god moguće uzročne bakterije ne pripadaju njegovom spektru delovanja.

Potrebno je uzeti u obzir zvanične smernice o pravilnoj primeni antibakterijskih lekova.

Doziranje i način primene

Doziranje

Tabela 1: Odrasli i deca telesne mase $\geq 40 \text{ kg}$

<i>Intermitentna primena</i>	
Infekcija	Doza leka koju treba primeniti
Bronhopulmonalne infekcije kod cistične fibroze	100 do 150 mg/kg/dan svakih 8 h, najviše 9 g dnevno ¹
Febrilna neutropenija	

Nozokomijalna pneumonija	2 g svakih 8 h
Bakterijski meningitis	
Bakterijemija*	1 - 2 g svakih 8 h
Infekcije kostiju i zglobova	
Komplikovane infekcije kože i mekih tkiva	
Komplikovane intraabdominalne infekcije	
Peritonitis povezan sa dijalizom kod pacijenata na CAPD	
Komplikovane infekcije urinarnog trakta	
Perioperativna profilaksa kod transuretralne resekcije prostate (TURP)	
Hronični supurativni <i>otitis media</i>	1 g do 2 g svakih 8 h
Maligni <i>otitis eksterna</i>	
Kontinuirana infuzija	
Infekcija	Doza leka koju treba primeniti
Febrilna neutropenija	Udarna doza od 2 g, a nakon toga 4 do 6 g svakih 24 sata putem kontinuirane infuzije ¹
Nozokomijalna pneumonija	
Bronhopulmonalne infekcije kod cistične fibroze	
Bakterijski meningitis	
Bakterijemija*	
Infekcije kostiju i zglobova	
Komplikovane infekcije kože i mekih tkiva	
Komplikovane intraabdominalne infekcije	
Peritonitis povezan sa dijalizom kod pacijenata na CAPD	

¹Kod odraslih sa normalnom bubrežnom funkcijom doza od 9 g/dan je primenjivana bez pojave neželjenih dejstava.

*Kada je povezana ili se sumnja da je povezana sa bilo kojom od infekcija navedenih u odeljku Terapijske indikacije.

Tabela 2: Deca telesne mase < 40 kg

Odojčad i mala deca uzrasta > 2 meseca i deca telesne mase < 40 kg	Infekcija	Uobičajena doza
Intermitentna primena		
	Komplikovane infekcije urinarnog trakta	
	Hronični supurativni <i>otitis media</i>	100 - 150 mg/kg/dan, podeljeno u tri doze, najviše 6 g/dan
	Maligni <i>otitis externa</i>	
	Neutropenija kod dece	
	Bronhopulmonalne infekcije kod cistične fibroze	
	Bakterijski meningitis	150 mg/kg/dan, podeljeno u tri doze, najviše 6 g/dan
	Bakterijemija*	
	Infekcije kostiju i zglobova	
	Komplikovane infekcije kože i mekih tkiva	
	Komplikovane intraabdominalne infekcije	100 - 150 mg/kg/dan podeljeno u tri doze, najviše 6 g/dan
	Peritonitis povezan sa dijalizom kod pacijenata na CAPD	
Kontinuirana infuzija		
	Febrilna neutropenija	
	Nozokomijalna pneumonija	
	Bronhopulmonalne infekcije kod cistične fibroze	
	Bakterijski meningitis	
	Bakterijemija*	Udarna doza od 60 - 100 mg/kg a nakon toga 100 - 200 mg/kg/dan, putem kontinuirane infuzije najviše 6 g/dan
	Infekcije kostiju i zglobova	
	Komplikovane infekcije kože i mekih tkiva	
	Komplikovane intraabdominalne infekcije	
	Peritonitis povezan sa dijalizom kod pacijenata na CAPD	
Novorođenčad i odojčad \leq 2 meseca	Infekcija	Uobičajena doza
Intermitentna primena		
	Većina infekcija	25 - 60 mg/kg/dan podeljeno u dve doze ¹

¹Kod novorođenčadi i odojčadi uzrasta \leq 2 meseca, poluvreme eliminacije ceftazidima u serumu može biti tri do četiri puta duže nego kod odraslih.
^{*}Kada je povezana ili se sumnja da je povezana sa bilo kojom od infekcija navedenih u odeljku Terapijske indikacije.

Pedijatrijska populacija

Bezbednost i efikasnost ceftazidima u obliku kontinuirane infuzije kod novorođenčadi i odojčadi uzrasta \leq 2 meseca nije utvrđena.

Starije osobe

Uzimajući u obzir smanjen klirens ceftazidima povezan sa životnim dobom kod starijih pacijenata, dnevna doza normalno ne sme da pređe 3 g kod pacijenata starijih od 80 godina.

Oštećenje jetre

Dostupni podaci ne ukazuju na potrebu prilagođavanja doze kod blagog do umerenog oštećenja funkcije jetre. Nema podataka iz studija za pacijente sa teškim oštećenjem funkcije jetre (videti i odeljak 5.2 Sažetka karakteristika leka). Savetuje se pažljivo kliničko praćenje bezbednosti i efikasnosti primene leka.

Renalno oštećenje

Ceftazidim se izlučuje nepromenjen putem bubrega. Zbog toga, dozu leka treba smanjiti kod pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

Treba dati inicijalnu udarnu dozu od 1 g. Doze održavanja se određuju na osnovu klirensa kreatinina:

Tabela 3: Preporučene doze održavanja leka Ceftazidim kod oštećenja funkcije bubrega - intermitentna infuzija

Odrasli i deca telesne mase \geq 40 kg

Klirens kreatinina mL/min	Približna vrednost kreatinina u serumu mikromol/L (mg/dL)	Preporučena jedinična doza leka Ceftazidim (g)	Učestalost doziranja (sati)
50 – 31	150 - 200 (1,7 - 2,3)	1	12
30 - 16	200 - 350 (2,3 - 4,0)	1	24
15 - 6	350 - 500 (4,0 - 5,6)	0,5	24
< 5	> 500 (> 5,6)	0,5	48

Kod pacijenata sa teškim infekcijama jediničnu dozu treba povećati za 50% ili povećati učestalost doziranja. Kod dece klirens kreatinina treba korigovati prema telesnoj površini ili telesnoj masi bez masti (eng. *lean body mass*, LBM).

Deca telesne težine $<$ 40 kg

Klirens kreatinina mL/min **	Približna vrednost serumskog kreatinina* mikromol/L (mg/dL)	Preporučena doza ceftazidima mg/kg (telesne težine)	Učestalost doziranja (sati)
50 - 31	150 - 200 (1,7 - 2,3)	25	12

30 - 16	200 - 350 (2,3 - 4,0)	25	24
15 - 6	350 - 500 (4,0 - 5,6)	12,5	24
< 5	> 500 (> 5,6)	12,5	48

*Navedene vrednosti kreatinina u serumu predstavljaju smernice koje ne moraju ukazivati na potpuno isti stepen redukcije za sve pacijente sa oslabljenom bubrežnom funkcijom.
** Procenjen na osnovu telesne površine ili izmeren

Savetuje se pažljivo kliničko praćenje bezbednosti i efikasnosti primene leka.

Tabela 4: Preporučene doze održavanja leka Ceftazidim kod oštećenja funkcije bubrega - kontinuirana infuzija

Odrasli i deca telesne mase ≥ 40 kg

Klirens kreatinina mL/min	Vrednosti serumskog kreatinina mikromol/L (mg/dL)	Učestalost doziranja (sati)
50 - 31	150 - 200 (1,7 - 2,3)	Udarna doza od 2 g, a nakon toga 1g do 3 g/24 sata
30 - 16	200 - 350 (2,3 - 4,0)	Udarna doza od 2 g, a nakon toga 1 g/24 sata
≤ 15	> 350 (> 4,0)	Nije procenjeno

Preporučuje se oprez kod izbora doze. Savetuje se pažljivo kliničko praćenje bezbednosti i efikasnosti primene leka.

Deca telesne mase < 40 kg

Nije utvrđena bezbednost i efikasnost ceftazidima primjenjenog u vidu kontinuirane infuzije, kod dece sa oštećenjem bubrežne funkcije i telesnom masom < 40 kg. Savetuje se pažljivo kliničko praćenje bezbednosti i efikasnosti primene leka.

Ukoliko se primenjuje kontinuirana infuzija kod dece sa oštećenjem funkcije bubrega, klirens kreatinina treba korigovati prema telesnoj površini ili telesnoj masi bez masti (eng. *lean body mass*, LBM).

Hemodializa

Poluvreme eliminacije ceftazidima u serumu se tokom hemodialize kreće od 3 do 5 sati. Dozu održavanja ceftazidima koja je preporučena u tabelama 5 i 6 treba ponovo primeniti nakon svake hemodialize.

Peritonealna dijaliza

Ceftazidim se takođe može koristiti kod pacijenata koji se podvrgavaju peritonealnoj dijalizi i kontinuiranoj ambulantnoj peritonealnoj dijalizi (CAPD).

Pored intravenske primene, ceftazidim se može dodati i u tečnost za dijalizu (obično 125 do 250 mg na 2 L tečnosti za dijalizu).

Kod pacijenata sa bubrežnom insuficijencijom na kontinuiranoj arterio-venskoj hemodializi ili visokoprotočnoj hemofiltraciji u jedinicama intenzivne nege: 1g dnevno, kao jedna doza, ili podeljeno u više doza. Kod niskoprotočne hemofiltracije potrebno je pridržavati se doziranja koje je preporučeno kod oštećenja funkcije bubrega.

Kod pacijenata na veno-venskoj hemofiltraciji i veno-venskoj hemodializi, potrebno je pridržavati se doziranja koje je preporučeno u tabelama 5 i 6, navedenim u nastavku:

Tabela 5: Smernice za doziranje kod kontinuirane veno-venske hemofiltracije

Rezidualna bubrežna funkcija (klirens kreatinina mL/min)	Doza održavanja (mg) pri brzini ultrafiltracije (mL/min) od ¹ :			
	5	16,7	33,3	50
0	250	250	500	500
5	250	250	500	500
10	250	500	500	750
15	250	500	500	750
20	500	500	500	750

¹ Dozu održavanja treba primenjivati svakih 12 sati

Tabela 6: Smernice za doziranje kod kontinuirane veno-venske hemodialize

Rezidualna bubrežna funkcija (klirens kreatinina mL/min)	Doza održavanja (mg) za dijalizat pri brzini protoka od ¹ :					
	1,0 litar/h			2,0 litar/h		
	Brzina ultrafiltracije (litar/h)			Brzina ultrafiltracije (litar/h)		
	0,5	1,0	2,0	0,5	1,0	2,0
0	500	500	500	500	500	750
5	500	500	750	500	500	750
10	500	500	750	500	750	1000
15	500	750	750	750	750	1000
20	750	750	1000	750	750	1000

¹ Dozu održavanja treba primenjivati svakih 12 sati

Način primene

Doza zavisi od težine, osetljivosti, mesta i vrste infekcije, kao i starosnog doba i bubrežne funkcije pacijenta.

Lek Ceftazidim treba primeniti putem intravenske injekcije ili infuzije, ili putem duboke intramuskularne injekcije. Preporučena mesta primene intramuskularne injekcije su gornji spoljašnji kvadrant mišića gluteus maximus ili lateralni deo butine. Rastvor leka Ceftazidim se može dati direktno u venu ili se uvodi kroz cevčicu sistema za infuziju ukoliko pacijent prima tečnost parenteralnim putem. Standardni preporučeni način primene je intravenska intermitentna injekcija ili intravenska kontinuirana infuzija. Intramuskularni način davanja leka treba razmotriti samo kada intravenska primena nije moguća ili je za pacijenta manje prikladna.

Za uputstvo o rekonstrukciji leka pre primene videti odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom).

Kontraindikacije

Preosetljivost na ceftazidim ili na bilo koji antibiotik iz grupe cefalosporina, kao i na pomoćnu supstancu leka (natrijum karbonat) (videti odeljak Lista pomoćnih supstanci).

Ranija teška alergijska reakcija (npr. anafilaktička reakcija) na bilo koji beta-laktamski antibiotik (penicilini, monobaktami i karbapenemi).

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Hipersenzitivnost

Kao i kod drugih beta-laktamskih antibiotika, ozbiljne, a ponekad i fatalne reakcije preosetljivosti su prijavljene i prilikom primene ceftazidima. U slučaju teške reakcije preosetljivosti na ceftazidim, primenu leka treba odmah obustaviti, a može biti neophodna i primena hitnih terapijskih mera.

Pre nego što se započne terapija ceftazidimom, treba pažljivo utvrditi da li je pacijent ranije imao teške reakcije preosetljivosti na ceftazidim, druge cefalosporine ili na bilo koje druge beta-laktamske antibiotike. Potreban je oprez kod pacijenata koji su imali reakciju preosetljivosti na druge beta-laktamske lekove koja nije bila teška.

Spektar dejstva

Ceftazidim ima uzak spektar antibakterijske aktivnosti. Nije preporučljivo da se koristi kao jedini lek u terapiji nekih tipova infekcije, osim ukoliko je poznato da se radi o patogenu koji je osetljiv na ceftazidim ili ako se prepostavlja da bi mogući uzročnici infekcije mogli biti osetljivi na ceftazidim. Ovo se posebno odnosi na pacijente sa bakterijemijom i bakterijskim meningitisom, infekcijama kože i mekih tkiva, infekcijama kostiju i zglobova. Takođe, ceftazidim je osetljiv na hidrolizu nekim beta-laktamazama proširenog spektra (eng. *extended spectrum beta-lactamases*, ESBL). Stoga, prilikom izbora ceftazidima u terapiji treba imati u vidu i prevalencu onih mikroorganizama koji produkuju date beta-laktamaze (ESBL).

Pseudomembranozni kolitis

Kolitis nastao usled upotrebe antibiotika i pseudomembranozni kolitis se mogu javiti usled primene skoro svih antibakterijskih lekova, uključujući i ceftazidim, a po težini mogu varirati od blagog, do oblika koji ugrožava život. Stoga je važno uzeti u obzir ovu dijagnozu kod pacijenata kod kojih se javi dijareja u toku lečenja ili nakon terapije ceftazidimom (videti odeljak Neželjena dejstva). Treba razmotriti prekid terapije i primeniti specifične terapijske mere za *Clostridium difficile*. Ne treba davati medicinske proizvode koji inhibiraju peristaltiku.

Renalna funkcija

Istovremene primene visokih doza cefalosporina i nefrotoksičnih lekova kao što su aminoglikozidi ili snažni diuretici (npr. furosemid) može nepovoljno uticati na funkciju bubrega.

Ceftazidim se izlučuje putem bubrega, zbog toga dozu treba smanjiti u odnosu na stepen bubrežnog oštećenja. Pacijente sa oštećenom bubrežnom funkcijom treba pažljivo kontrolisati po pitanju bezbednosti i efikasnosti. Neurološke sekvele su povremeno bile prijavljivane u slučajevima kada doza leka nije bila smanjena kod pacijenata sa renalnim oštećenjem (videti odeljke Doziranje i način primene i Neželjena dejstva).

Prekomerni rast neosetljivih mikroorganizama

Producena upotreba leka može dovesti do prekomernog rasta neosetljivih mikroorganizama (kao što su enterokoke, gljivice), što može zahtevati prekid terapije ili primenu odgovarajućih mera. Ponovna procena pacijentovog stanja je veoma bitna.

Interakcije sa testovima i laboratorijskim ispitivanjima

Ceftazidim ne utiče na ispitivanje glikozurije pomoću enzimskih testova. Može doći do neznatnog uticaja (lažno pozitivni rezultat) na metode koje se zasnivaju na redukciji jona bakra (*Benedict-ov test, Fehling-ov test, Clinitest*). Ceftazidim ne utiče na određivanje kreatinina preko eseja sa alkalnim pikratom.

Razvoj pozitivnog *Coombs-ovog* testa povezan sa upotrebom ceftazidima kod oko 5% pacijenata može da utiče na unakrsnu analizu krvi.

Sadržaj natrijuma:

Ovaj lek sadrži 2,17 mmol (50 mg) natrijuma po dozi. Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod pacijenata koji su na dijeti u kojoj se kontroliše unos natrijuma.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Studije interakcija su sprovedene samo sa probenecidom i furosemidom.

Istovremena primena visokih doza cefalosporina i nefrotoksičnih lekova može negativno uticati na renalnu funkciju (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotebi leka).

Hloramfenikol *in vitro* deluje antagonistički na ceftazidim i ostale cefalosporine. Nije poznat klinički značaj ovog nalaza, međutim, ukoliko se planira istovremena primena ceftazidima sa hloramfenikolom treba uzeti u obzir mogućnost antagonističkog delovanja.

Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Postoji malo podataka o upotrebi ceftazidima kod trudnica. Studije na životnjama nisu pokazale direktnе ili indirektne štetne efekte leka na trudnoću, embrionalni/fetalni razvoj, porođaj ili postnatalni razvoj (videti odeljak 5.3 Sažetka karakteristika leka).

Ceftazidim se može primeniti tokom trudnoće samo ukoliko je očekivana korist za trudnicu veća od mogućeg rizika po fetus.

Dojenje

Ceftazidim se izlučuje u majčino mleko u niskim koncentracijama koje ne bi trebalo da imaju štetno dejstvo kod odojčadi. Ceftazidim se može primenjivati kod žena koje doje.

Fertilitet

Nema dostupnih podataka.

Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama

Nisu sprovedene studije o uticaju leka na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama. Ipak, mogu se javiti neželjena dejstva (npr. vrtoglavica) koja mogu uticati na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama (videti odeljak Neželjena dejstva).

Neželjena dejstva

Najčešće neželjene reakcije su eozinofilija, trombocitoza, flebitis ili tromboflebitis (prilikom intravenske primene), dijareja, prolazno povećanje enzima jetre, makulopapularni osip ili urtikarija, bol i/ili inflamacija nakon intramuskularne injekcije, kao i pozitivan Coombs-ov test.

Korišćeni su podaci iz sponzorisanih i nesponzorisanih kliničkih ispitivanja da bi se odredila učestalost čestih i povremenih neželjenih dejstava. Učestalost javljanja ostalih neželjenih dejstava je uglavnom određena na osnovu postmarketinškog praćenja i odnosi se pre na stopu prijavljivanja nego na pravu učestalost. U okviru svake grupe učestalosti, neželjena dejstva su prikazana prema redosledu opadajuće ozbiljnosti.

Navedena neželjena dejstva su klasifikovana prema sistemima organa i prema učestalosti kao: veoma česta ($\geq 1/10$); česta ($\geq 1/100$ do $< 1/10$); povremena ($\geq 1/1\,000$ do $< 1/100$); retka ($\geq 1/10\,000$ do $< 1/1\,000$); veoma retka ($< 1/10\,000$); nepoznata učestalost (ne može se odrediti na osnovu raspoloživih podataka).

Klasa sistema organa	Često	Povremeno	Veoma retko	Nepoznato
Infekcije i infestacije		Kandidijaza (uključujući vaginitis i oralnu kandidizazu - <i>soor</i>)		
Poremećaji krvi i limfnog sistema	Eozinofilija, trombocitoza	Neutropenija, leukopenija, trombocitopenija		Agranulocitoza, hemolitička anemija, limfocitoza
Poremećaji imunskog sistema				Anafilaksa (uključujući bronhospazam i/ili hipotenziju – videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka)
Poremećaji nervnog sistema		Glavobolja, vrtoglavica		Neurološke sekvele ¹ , parestezija
Vaskularni poremećaji	Flebitis i tromboflebitis kod intravenske primene			

Gastrointestinalni poremećaji	Dijareja	Dijareja i kolitis ² kao posledica primene antibakterijskih lekova (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka) Abdominalni bol mučnina, povraćanje		Neprijatan ukus
Hepatobilijarni poremećaji	Povećanje nivoa jednog ili više hepatičkih enzima ³			Žutica
Poremećaji kože i potkožnog tkiva	Makulopapularni osip, urtikarija	Svrab		Toksična epidermalna nekroliza, <i>Stevens Johnson-ov sindrom</i> , multiformni eritem, angioedem, reakcija na lek praćena eozinofilijom i sistemskim simptomima (DRESS) ⁴
Poremećaji bubrega i urinarnog sistema		Prolazna povećanja nivoa ureje i azotnih materija (BUN) u krvi, i/ili kreatinina u serumu	Intersticijalni nefritis, akutna bubrežna insuficijencija	
Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene	Bol i/ili zapaljenje nakon intramuskularne injekcije	Groznica		
Ispitivanja	Pozitivan Coombs-ov test ⁵			

¹Bilo je izveštaja o neurološkim sekvelama, uključujući tremor, miokloniju, konvulzije, encefalopatiju i komu kod bolesnika sa oštećenom funkcijom bubrega kod kojih doza ceftazidima nije bila adekvatno smanjena.

²Dijareja i kolitis se mogu dovesti u vezu sa *Clostridium difficile* i javiti se u sklopu pseudomembranoznog kolitisa.

³ALT (SGPT), AST (SGOT), LDH, GGT, alkalna fosfataza.

⁴Bilo je retkih izveštaja u kojima je DRESS bio povezan sa primenom ceftazidima.

⁵Pozitivan Coombs-ov test se javlja kod oko 5 % bolesnika i može uticati na unakrsno ispitivanje krvi.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
fax: +381 (0)11 39 51 131
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Predoziranje

Predoziranje može da dovede do neuroloških posledica, uključujući encefalopatiju, konvulzije i komu. Simptomi predoziranja se mogu javiti ukoliko doza nije adekvatno smanjena kod pacijenata sa oštećenjem bubrežne funkcije (videti odeljke Doziranje i način primena i Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

Koncentacija ceftazidima u serumu se mogu smanjiti hemodializom ili peritonealnom dijalizom.

FARMACEUTSKI PODACI

Lista pomoćnih supstanci

Natrijum-karbonat

Inkompatibilnost

Ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima, osim sa onima koji su navedeni u odeljku Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom).

Ceftazidim je manje stabilan u rastvoru natrijum-hidrogenkarbonata, nego u drugim rastvorima za intravensku primenu. Stoga se rastvor natrijum-hidrogenkarbonata ne preporučuje kao rastvarač.

Ceftazidim i aminoglikozidi se ne smeju mešati u istom setu ili špricu. Prijavljena je precipitacija u slučaju dodavanja vankomicina u rastvor sa ceftazidimom. Preporučuje se ispiranje setova i linija za intravensku primenu između primene ova dva leka.

Rok upotrebe

Rok upotrebe neotvorene boćice: 3 godine.

Rok upotrebe nakon rekonstitucije/razblaženja: upotrebiti odmah.

Dokazana je fizičko-hemijska stabilnost leka nakon rekonstitucije u roku od 24 sata nakon pripreme ukoliko se čuva pod navedenim uslovima i ukoliko je pripremljen uz pomoć nekog od navedenih rastvarača:

Rastvarač Koncentracija rastvora Uslovi
Voda za injekciju 70 mg/mL
280 mg/mL 24 sata na temperaturi 25 ± 2 °C
24 sata na temperaturi 5 ± 3 °C
0,5% lidokain-hidrohlorid
rastvor za injekciju 260 mg/mL 24 sata na temperaturi 25 ± 2 °C
24 sata na temperaturi 5 ± 3 °C
1% lidokain-hidrohlorid
rastvor za injekciju 280 mg/mL 24 sata na temperaturi 25 ± 2 °C
24 sata na temperaturi 5 ± 3 °C
Bakteriostatska voda za injekciju 250 mg/mL 24 sata na temperaturi 25 ± 2 °C
24 sata na temperaturi 5 ± 3 °C
0,9% rastvor natrijum-hlorida za injekcije 1 mg/mL
40 mg/mL
250 mg/mL 24 sata na temperaturi 25 ± 2 °C
24 sata na temperaturi 5 ± 3 °C
5% rastvor glukoze za injekcije 1 mg/mL
40 mg/mL 24 sata na temperaturi 25 ± 2 °C
24 sata na temperaturi 5 ± 3 °C

S mikrobiološke tačke gledišta rastvor treba primeniti odmah nakon pripreme za upotrebu. Ukoliko se odmah ne upotrebi, odgovornost za vreme i uslove čuvanja pre upotrebe preuzima korisnik i ne bi trebalo da bude duže od 24 sata na temperaturi 2 do 8 °C, osim ukoliko se rekonstitucija/razblaženje vrši pod kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.

Lek se ne sme koristiti posle isteka roka označenog na pakovanju.

Posebne mere opreza pri čuvanju

Uslovi čuvanja neotvorene boćice:

Čuvati u originalnom pakovanju.

Lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.

Za uslove čuvanja nakon rekonstitucije/razblaženja videti odeljak Rok upotrebe.

Priroda i sadržaj pakovanja

Unutrašnje pakovanje gotovog leka:

Bezbojna staklena boćica (hidrolitičke otpornosti III) zapremine 10 mL, zatvorena čepom od brombutil gume, aluminijumskim prstenom i plastičnim poklopcom (*flip-off* zatvarač), koja sadrži 1 g ceftazidima u obliku ceftazidim, pentahidrata.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 boćica i uputstvo za lek.

Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)

Rastvor se nakon rekonstitucije mora odmah upotrebiti.

Rastvor je samo za jednokratnu upotrebu. Neiskorišćenu količinu rastvora treba baciti.

Uputstvo za rekonstituciju leka:

U tabeli u nastavku su date zapremine rastvarača koje treba dodati i dobijene koncentracije rastvora, što može biti korisno u slučaju primene podeljenih doza:

Doza Način primene Količina dodatog rastvarača Približna koncentracija (mg/mL)

1g intramuskularno 3 ml 260

1 gintravenski bolus 10 ml 90

1 gintravenska infuzija 50 ml* 20

* Dodavanje rastvarača se odvija u dve faze

Kada se rekonstituiše za intramuskularnu upotrebu, lek Ceftazidim se može rastvoriti sa 0,5%# ili 1% lidokain-hidrohlorid rastvorom za injekciju.

U Republici Srbiji nije komercijalno dostupan 0,5% lidokain-hidrohlorid rastvor za injekcije.

Ceftazidim je u koncentraciji od 1 do 40 mg/mL kompatibilan sa sledećim rastvorima za infuziju:

- 0,9% rastvor natrijum-hlorida za injekcije
- 5% rastvor glukoze za injekcije

Priprema rastvora za intramuskularnu i intravensku bolus injekciju:

1. Igrom šprica probušite zatvarač boćice i injicirajte preporučeni volumen rastvarača.

2. Izvadite iglu i promućkajte sadržaj boćice. Doći će do oslobođanja ugljen-dioksida. Rastvor se izbistri nakon 1 do 2 minuta.

3. Okrenite boćicu naopako. Držeći klip šprica do kraja pritisnut, probušite igrom zatvarač boćice i uvucite celu zaprminu rastvora u špric. Uverite se da se igla šprica nalazi u rastvoru, a ne u praznom prostoru iznad. Uvučeni rastvor može da sadrži male mehuriće ugljen-dioksida; oni se mogu zanemariti.

Prilikom intravenske primene, ovako pripremljeni rastvori se mogu davati direktno u venu ili se mogu uvoditi u cevčicu seta ukoliko pacijent prima parenteralne tečnosti. Ceftazidim je kompatibilan sa većinom intravenoznih tečnosti koje se najčešće koriste.

*Priprema rastvora za intravensku infuziju:

Priprema se korišćenjem ukupno 50 mL kompatibilnog rastvarača, koji se dodaje u dva koraka:

1. Igrom šprica probušite zatvarač boćice i injicirajte 10 mL rastvarača.

2. Izvadite iglu i promućkajte sadržaj boćice dok se rastvor ne izbistri.

3. Nemojte ubacivati iglu koja služi za oslobođanje gasa sve dok se prašak ne rastvori. Kada je rastvaranje završeno, gurnite iglu za oslobođanje gasa kroz gumeni zatvarač kako bi se pritisci izjednačili.

4. Rekonstituisani rastvor prebacite u konačni sistem za infuziju, tako da se dobije ukupna zapremina od najmanje 50 mL infuzionog rastvora. Intravensku infuziju primenite u trajanju od 15 do 30 minuta.

Napomena: Da bi se očuvala sterilnost proizvoda, veoma je važno da se igla za oslobođanje gasa ne ubacuje kroz zatvarač boćice sve dok se prašak potpuno ne rastvori.

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.