

UPUTSTVO ZA LEK

DIDERMAL® 0,5 mg/g + 1 mg/g, krem betametazon, gentamicin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.
- Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.
- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek DIDERMAL krem i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek DIDERMAL krem
3. Kako se upotrebljava lek DIDERMAL krem
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek DIDERMAL krem
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LEK DIDERMAL krem I ČEMU JE NAMENJEN

DIDERMAL krem u svom sastavu sadrži kombinaciju dve aktivne supstance, betametazondipropionat i gentamicin-sulfat. Betametazondipropionat pripada grupi lekova koji se zovu topikalni kortikosteroidi, a koji lokalno primenjeni na kožu smanjuju crvenilo i svrab, simptome koji nastaju usled različitih bolesti kože. Gentamicin je antibiotik širokog spektra iz grupe aminoglikozida za lokalnu upotrebu, koji leчи bakterijske infekcije izazvane mikroorganizmima osetljivim na gentamicin.

DIDERMAL krem se primenjuje za lečenje bolesti kože koje reaguju na lokalnu terapiju kortikosteroidima, a koje su primarno ili sekundarno inficirane bakterijama, odnosno primenjuje se i kada postoji mogućnost nastanka takvih infekcija uključujući ekcem (oboljenje kože praćeno svrabom i crvenilom), dermatitis (zapaljenje kože) i psorijazu (oboljenje kože praćeno pojavom roze ili srebrnkastih ljuspica na laktovima, kolenima, glavi i drugim delovima tela, koje su praćene svrabom).

DIDERMAL krem može da se primenjuje kod odraslih, adolescenata i dece starije od 1 godine.

2. ŠTA TREBA DAZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DIDERMAL krem

Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Lek DIDERMAL krem ne smete upotrebljavati ukoliko:

- ste preosetljivi na betametazon-dipropionat, gentamicin ili bilo koji od pomoćnih sastojaka leka DIDERMAL krem (videti deo 6);
- imate neko drugo oboljenje kože: rozaceu (izraženo crvenilo kože nosa i oko nosa), akne, tuberkulozu kože, virusne infekcije kože (herpes), vakciniju (reakcija posle vakcinacije), varičele (ovčije beginje);
- perioralni dermatitis;
- perianalni i genitalni pruritus;
- sifilis;
- imate dete mlađe od 1 godine.

Ukoliko niste sigurni da li se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, obratite se svom lekaru.

Kada uzimate lek DIDERMAL krem posebno vodite računa:

Ukoliko Vam se pri prvom nanošenju preparata DIDERMAL krem pojave alergijske reakcije praćene svrabom, peckanjem i crvenilom, odmah prestanite sa primenom leka i javite se lekaru.

Ne preporučuje se primena leka DIDERMAL krem na lice duže od 5 dana.

Ne preporučuje se primena leka DIDERMAL krem kod dece na bilo kom delu tela duže od 5 dana.

Ukoliko primenjujete DIDERMAL krem kod dece mlađe od 2 godine, neophodan je poseban oprez.

Ne primenjujte lek DIDERMAL krem ispod zavoja, folija, osim kada je to neophodno, kao ni ispod pelena (posebno plastičnih) kod dece starije od 1 godine, jer se na taj način pojačava resorpcija leka kroz kožu, a samim tim i nastanak neželjenih dejstava.

Ne preporučuje se dugotrajna primena (svakodnevno više nedelja ili meseci) leka DIDERMAL krem na velikim površinama kože, posebno ispod zavoja. Ne primenjujte DIDERMAL krem u oko ili u blizini oka zbog mogućnosti nastanka katarakte (mrena) ili glaukoma (povišen očni pritisak).

U slučaju pojave gljivične, odnosno bakterijske superinfekcije kožnih promena, potrebna je dodatna lokalna primena odgovarajućeg leka, koji će Vam preporučiti lekar.

Neki delovi tela kao što su prepone, pazuh i perianalna regija (predeo oko čmara), podložniji su nastanku strija pri lokalnom lečenju preparatom DIDERMAL krem, tako da njegova primena na navedenim područjima treba da bude što kraća.

Ne primenjujte DIDERMAL krem za lečenje rana na nogama koje nastaju od oboljenja vena (ulcus cruris).

Ne preporučuje se primena leka na kosmatim delovima tela.

Dugotrajna, lokalna primena gentamicina može prouzrokovati pojavu mikroorganizama otpornih na gentamicin.

Moguća je pojava ukrštene reakcije preosetljivosti sa drugim aminoglikozidnim antibioticima.

Primena drugih lekova

Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste donedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Uzimanje leka DIDERMAL krem sa hranom ili pićima

Nije primenljivo.

Primena leka DIDERMAL krem u periodu trudnoće i dojenja

Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Trudnoća

Pitajte svog lekara ili farmaceuta za savet pre nego što počnete da koristite DIDERMAL krem. Ukoliko ste trudni ne treba da primenjujete DIDERMAL krem.

Dojenje

Ukoliko dojite, DIDERMAL krem možete primenjivati prema proceni Vašeg lekara, ali preparat ne smete nanositi na kožu dojki pre dojenja.

Uticaj leka DIDERMAL krem na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Primena leka DIDERMAL krem nema uticaja na sposobnost upravljanja motornim vozilima i mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka DIDERMAL krem

DIDERMAL krem sadrži metil - parahidroksibenzoat (E218) i propil - parahidroksibenzoat (E216), pa može izazvati alergijske reakcije, čak i odložene, a izuzetno i bronhospazam. Cetostearilalkohol iz krema može prouzrokovati lokalne reakcije kože (npr. kontaktni dermatitis), a zbog propilenglikola može doći do iritacije kože.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DIDERMAL krem

Uvek primenjujte lek DIDERMAL krem tačno onako kako Vam je lekar odredio. Proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni u način primene. Ne prekidajte tretman dok se ne posavetujete sa svojim lekarom iako je nastupilo poboljšanje bolesti.

Lek DIDERMAL krem je namenjen isključivo za lokalnu primenu u terapiji akutnih i vlažnih promena na koži. Lek DIDERMAL krem primenjujte samo na čistu i suvu kožu.

DIDERMAL krem nanosite samo na čistu i suvu kožu. Pre i posle primene leka dobro operite ruke.

Količinu preparata DIDERMAL krem, koja je potrebna da bi se pokrila bolesna površina kože, nanesite dva puta dnevno u tankom sloju, laganim utrljavanjem. Češća primena leka se preporučuje na mestima sa kojih se preparat tokom normalnih aktivnosti lako uklanja (kao što su dlanovi i tabani).

Lečenje traje do nestanka simptoma, što zavisi od vrste i trajanja bolesti (akutna stanja 2-5 dana, hronične bolesti 2-3 nedelje). Kod hroničnih bolesti lečenje treba nastaviti, uz stalni nadzor lekara, još 3-7 dana nakon nestanka svih simptoma, kako bi se sprečila ponovna pojava bolesti (recidiv).

Deca

Zbog veće površine kože u odnosu na telesnu masu i nedovoljno razvijenog rožnatog sloja, kod dece može doći do resorpcije proporcionalno veće količine betametazona pri lokalnoj primeni, a shodno tome i do ispoljavanja sistemske toksičnosti. Ne preporučuje se primena krema ispod pelena (naročito plastičnih), jer imaju okluzivno dejstvo i mogu da pojačaju resorpciju aktivnih supstanci. Primena leka kod dece mora biti ograničena na najkraće moguće vreme.

Trajanje lečenja

Lečenje po pravilu ne treba da bude duže od 3 nedelje.

Ako ste naneli više leka DIDERMAL krem nego što je trebalo

U slučaju da Vi ili Vaše dete proguta lek DIDERMAL krem, neće doći do neželjenih dejstava. Međutim, ako ste zabrinuti, javite se lekaru.

U slučaju kada DIDERMAL krem nanosite na velike površine oštećene i, kao posledica toga, propustljivije kože tokom dužeg vremenskog perioda (duže od 3 nedelje) i uz primenu zavoja, kao i kada ga dugotrajno primenjujete kod dece, može doći do njegove pojačane resorpcije u krvotok i ispoljavanja sistemskog dejstva - slabljenje funkcije hipotalamo-hipofizno-nadbubrežne osovine sa zastojem rasta i pojmom intrakranijalne hipertenzije (povišenje pritiska unutar lobanje) koja se javlja samo kod dece, Cushing-ovog sindroma, hiperglikemije (porast nivoa šećera u krvi), glukozurije (pojava šećera u mokraći). Znaci slabljenja spomenute osovine kod dece uključuju usporen rast, smanjeno povećanje telesne mase, smanjenje kortizola (hormon nadbubrežne žlezde) u plazmi i mokraći, kao i izostanak odgovora na ACTH (hormon hipofize) stimulaciju. Intrakranijalna hipertenzija manifestuje se ispuštenjem fontanela, glavoboljom i obostranim otokom očnog živca.

Lečenje predoziranja je simptomatsko, uz uobičajene mere za održavanje normalne funkcije organizma, s tim da je potrebno odmah obustaviti primenu leka.

Ako ste zaboravili da primenite lek DIDERMAL krem

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

Ukoliko ste zaboravili da primenite lek u određeno vreme, učinite to čim se setite i nastavite sa primenom onako kako Vam je lekar propisao.

Ako naglo prestanete da primenjujete lek DIDERMAL krem

Nije primenljivo.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Lek DIDERMAL krem, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

DIDERMAL krem može da prouzrokuje sledeće lokalne neželjene reakcije na mestu primene: crvenilo, peckanje, pojavu plikova, ljuštenje kože, otok, svrab, žarenje, osip, suvu kožu, zapaljenje korena dlake (folikulitis), prekomernu maljavost (hipertrikoza), hipopigmentaciju (bele mrlje koje nastaju kao posledica smanjenja količine pigmenta melanina u koži), alergijski kontaktni dermatitis (crvenilo, otok i zapaljenjski mehurići na koži), sekundarne infekcije kože, smanjenje sadržaja kolagena u potkožnom tkivu što može prouzrokovati istanjenje kože, pojavu strija, ekhimoza (tačkasta krvarenja u koži) i teleangiektažija (vidljivo proširenje kapilara u koži). Pojava neželjenih reakcija je češća kod odojčadi i dece.

Lokalna neželjena dejstva na gentamicin se manifestuju najčešće u vidu reakcije preosetljivosti na koži, koja se karakteriše pojavom osipa, svraba, crvenila, otoka ili drugih znakova iritacije koji nisu bili prisutni pre početka lečenja.

Sistemska neželjena dejstva se veoma retko javljaju, uglavnom kao posledica predoziranja i obično nestaju odmah posle prekida lečenja. Količina betametazona u leku retko može pri pravilnoj primeni da dovede do pojave sistemskih neželjenih dejstava. Jedino u slučaju da se lek nanosi na velike površine oštećene, a samim tim i propustljive kože, ako se koristi duži vremenski period, ispod okluzije ili ako se primenjuje kod dece i bolesnika sa oštećenom funkcijom jetre, može doći do pojave sistemskih neželjenih efekata koji podrazumevaju: slabljenje funkcije osovine hipotalamus-hipofiza-nadbubrežna žlezda (gubitak apetita, gubitak težine, umor, malaksalost, osećaj slabosti ili nesvestice tokom dužeg stajanja ili naglog ustajanja, poremećaji menstruacije), zaostajanje u rastu i porast intrakranijalnog pritiska kod dece (povišenje pritiska unutar lobanje), loše podnošenje šećera (smanjenje tolerancije) i povećan nivo šećera u krvi (žed i učestalo mokrenje), Cushing-ov sindrom (karakteristično okruglo lice, neuobičajen umor, malaksalost, depresija, nepravilnosti u menstrualnom ciklusu, smanjenje seksualne želje (smanjenje libida).

Poremećaji sluha i sistema za ravnotežu (oštećenje sluha, zujanje u ušima) se javljaju izuzetno retko i to u slučaju potpune resorpkcije gentamicina i kod bolesnika sa poremećenom funkcijom bubrega. Ova neželjena dejstva se javljaju češće kod bolesnika koji koriste i druge lekove koji toksično deluju na sluh i bubrege ili kod bolesnika sa poremećenom funkcijom bubrega.

Ukoliko se lek DIDERMAL krem primenjuje u oko ili u blizini oka može doći do pojave glaukoma (povišen očni pritisak), gljivične infekcije oka ili zamućenja vida.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.

5. KAKO ĆUVATI LEK DIDERMAL krem

Čuvati van domaćaja i vidokruga dece.

Rok upotrebe

3 godine

Nemojte koristiti lek DIDERMAL krem posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.
Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

Čuvanje

Čuvati na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.
Posle prvog otvaranja čuvati na temperaturi do 25° C, u originalnom pakovanju, najduže 28 dana.

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek DIDERMAL krem

Sadržaj aktivnih supstanci:

1 g krema sadrži 0,5 mg betametazona (u obliku betametazondipropionata) i 1 mg gentamicina (u obliku gentamicin - sulfata)

Sadržaj pomoćnih supstanci:

cetostearilalkohol; parafin, tečni, laki; parafin, beli, meki; glicerolmonostearat 40 - 55; natrijum - laurilsulfat; propilenglikol; metil - parahidroksibenzoat (E218); propil - parahidroksibenzoat (E216); voda, prečišćena

Kako izgleda lek DIDERMAL krem i sadržaj pakovanja

Izgled:

Homogen krem, bele do skoro bele boje.

Pakovanje:

tuba sa 15 g krema

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija

Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd, Republika Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Avgust, 2013.

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

515-01-01935-13-001 od 18.09.2013.