

Flonivin® Boulardii, kapsule

Dijetetski proizvod - hrana za posebne medicinske namene

Flonivin® Boulardii, kapsule je hrana za posebne medicinske namene sa 10 milijardi korisnih mikroorganizama *Saccharomyces boulardii*, cinkom i vitaminom D3, namenjena za potrebe ishrane kod osoba sa nedostatkom cinka, hipovitaminozom vitamina D, kod osoba sa akutnim i putničkim dijarejama, dijarejama uzrokovanim antibioticima, uz standardnu terapiju infekcije bakterijom *Helicobacter pilory*, kod zapaljenskih bolesti creva (Kronova bolest, ulceroznog kolitisa) i sindroma „nervoznih creva“, uz terapiju infekcije bakterijom *Clostridium difficile*, kao pomoć u regulaciji crevne mikroflore, kod osoba sa oslabljenim i poremećenim imunitetom sklonih čestim infekcijama, kao i kod osoba sa ostalim poremećajima i stanjima kod kojih je neophodna nadoknada vitamina D3 i cinka.

Sastav aktivnih komponenti	1 kapsula	% NRV*	100 g
Liofilizovana kultura korisnih mikroorganizama <i>Saccharomyces boulardii</i>	500 mg (10×10^9 CFU**)	-	75,1 g
Cink (cink-oksid emulgовани prašak)	10 mg	100	1,5 g
Vitamin D3 (holekalciferol)	25 µg	500	3,8 mg

*NRV – nutritivna referentna vrednost

**CFU – broj bakterija koje formiraju koloniju

Sastoјci

Saccharomyces boulardii, hidroksipropil-metilceluloza (zgušnjivač), titan-dioksid i žuti oksid gvožđa (boje), cink-oksid, holekalciferol, magnezijum-stearat (sredstvo protiv zgrudnjavanja).

Upotreba

Odrasli i deca uzrasta iznad 12 godina: Jednom dnevno popiti jednu kapsulu, bez žvakanja i uz dovoljnu količinu vode.

Napomene

Proizvod je nutritivno nepotpuna namirnica i nije pogodan za upotrebu kao jedini izvor hrane za osobe kojima je namenjen.

Čuvati van domaćaja dece.

Upozorenja

Preporučena dnevna doza se ne sme prekoračiti.

Proizvod ne smeju da koriste osobe preosetljive na bilo koji sastojak proizvoda.

Proizvod nije namenjen mlađima od 12 godina, osobama sa čirom na želucu i dvanaestopalačnom crevu, kao ni osobama sa hiperkalcemijom i hiperparatiroidizmom.

Osobe na terapiji antimikoticima ne treba da koriste **Flonivin® Boulardii, kapsule**, zbog mogućeg izostanka terapijskog dejstva.

Primena proizvoda sa *Saccharomyces boulardii* se ne preporučuje kod imunokompromitovanih osoba, osoba na imunosupresivnoj terapiji, uključujući i pacijente sa alograftom, neposredno nakon hirurških operacija, kod osoba sa krvavom dijarejom, kao i kod osoba sa centralnim venskim kateterom.

Trudnice i dojilje mogu da koriste ovaj proizvod samo po nalogu svog lekara.

Potreban je oprez kod osoba koje uzimaju tiazide, kardiotonične glikozide, rifampicin, izoniazid, fenitoin i barbiturate.

Istovremena primena sa kortikosteroidima može dovesti do smanjenja dejstva ovog proizvoda.

Proizvod se mora koristiti pod medicinskim nadzorom.

Nije namenjeno za parenteralnu upotrebu.

Način čuvanja

Čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage, na temperaturi do 25 °C.

Rok upotrebe

Ne sme se koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

Pakovanje

10 kapsula

Proizvedeno u Republici Srbiji.

Nosilac upisa u bazu podataka Ministarstva zdravlja Republike Srbije:

Galenika a.d., Batajnički drum b.b., 11080 Beograd, Republika Srbija

/ Galenika logo /