

Oligovit®
complex
dodatak ishrani

Aktivni sastojci	1 film tableta	%PDU*
Vitamin A	400 µg RE	50
Vitamin D	6 µg	120
Vitamin E	15 mg TE	125
Vitamin B ₁	2 mg	182
Vitamin B ₂	2 mg	143
Vitamin B ₆	3 mg	214
Vitamin C	100 mg	125
Vitamin B ₁₂	6 µg	240
Niacin	10 mg	63
Pantotenska kiselina	10 mg	167
Kalcijum	120 mg	15
Molibden	100 µg	200
Hrom	30 µg	75
Fluorid	0,6 mg	17
Mangan	0,5 mg	25
Bakar	0,5 mg	50
Cink	1,5 mg	15
Magnezijum	60 mg	16
Gvožđe	20 mg	143
Jod	30 µg	20

*PDU-preporučen dnevni unos

Sastojci: sredstvo za povećanje zapremine: mikrokristalna celuloza; kalcijum-fosfat; askorbinska kiselina; magnezijum-oksid; gvožđe-sulfat; DL- α -tokoferilacetat; nikotinamid; kalcijum-pantotenat; stabilizator: unakrsno vezana natrijum-karboksimetilceluloza; zgušnjivač: hidroksipropilmetylceluloza; stabilizator: magnezijum-stearat; sredstvo protiv zgrudvavanja: stearinska kiselina; zgušnjivač: makrogol; sredstvo za glaziranje: šelak; piridoksin-hidrohlorid; sredstvo protiv zgrudvavanja: talk; tiamin-hidrohlorid; riboflavin; cink-sulfat; boje: E 172, E 171;

natrijum-fluorid; mangan-sulfat; bakar-sulfat; stabilizator: polivinilpirolidon; boja: E 120; retinil-acetat; ricinusovo ulje; natrijum-molibdat; hrom-hlorid; kalijum-jodid; holekalciferol; cijanokobalamin:

Dejstvo

Oligovit® film tablete su kombinacija 10 vitamina i 10 najpotrebnijih minerala. Oligovit® film tablete mogu da podmire povećane potrebe organizma za vitaminima i mineralima kao i da nadoknade njihov nedostatak u ishrani (jednolična ishrana, dijeta, alkoholizam). Vitamin i minerali koji ulaze u sastav Oligovit® film tableta mogu da doprinesu povećanju otpornosti organizma prema bolestima, za rastenje, razvoj i normalno funkcionisanje organizma, jer neposredno učestvuju u biohemiskim procesima.

Oligovit® film tablete se preporučuju:

- kao dodatak ishrani u stanjima neadekvatne ishrane (u toku dijete, gladovanja)
- kao dopuna u vitaminima i mineralima u toku trudnoće i dojenja
- kod premorenosti posle teškog fizičkog napora
- u stanjima oporavka posle: bolesti praćenih visokim temperaturama, hirurških zahvata
- kod zaostajanja u rastenu, nedostatka apetita, gubitka u telesnoj masi
- kod deficita nastalog zbog gastrointestinalnih i hepatobilijarnih bolesti
- kod stresnih stanja u kojima su moguće povećane potrebe za vitaminima i mineralima.

Način primene

1 film tableta dnevno.

Upozorenja

Ne sme se prekoračiti preporučena dnevna doza.

Oligovit® film tablete ne smeju koristiti osobe alergične na bilo koji sastojak proizvoda.

Ne preporučuje se istovremeno uzimanje drugih preparata koji sadrže vitamin A i D zbog mogućnosti predoziranja vitamina A i D.

Zbog potencijalnih interakcija gvožđa i kalcijuma sa pojedinim namirnicama i lekovima, Oligovit® film tablete treba uzimati najmanje 2 sata pre ili posle njihove primene. U te namirnice spadaju:

mleko i mlečni proizvodi, jaja, spanać, hleb od integralnog brašna, žitarice, testenina, čaj, kafa, kakao.

Oligovit® film tablete ne treba istovremeno koristiti sa sledećim lekovima: tetraciklinom, penicilinom, hinolonima, hloramfenikolom, rifampicinom, metildopom, paracetamolom, indometacinom, penicilaminom, antacidima sa aluminijumom, magnezijumom i kalcijumom.

Napomena

Dodaci ishrani se ne mogu koristiti kao zamena za raznovrsnu ishranu.

Način čuvanja

Čuvati na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju.

Čuvati van domaćaja dece.

Rok upotrebe

Ne sme se koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

Pakovanje

30 film tableta

Proizvodač i nosilac upisa u bazu podataka Ministarstva zdravlja Republike Srbije:

Galenika a.d., 11080 Beograd, Batajnički drum b.b.

