

OROSAL® 65

Prašak za oralni rastvor

(glukozno-elektritolitni rastvor za rehidraciju dece i odraslih)

hrana za posebne medicinske namene

OROSAL® 65 služi za nadoknadu tečnosti i elektrolita u lakšim i srednje teškim dijarejalnim poremećajima, kao i u drugim stanjima praćenim povećanim potrebama za vodom i elektrolitima kao što su teške opekomine, priprema bolesnika za rendgenska i endoskopska ispitivanja debelog creva i druge.

Sastoјци	1 kesica (13 g)	100 g
Glukoza	10,00 g	76,92 g
Natrijum-hlorid	1200 mg	9230,77 mg
Natrijum-hidrogenkarbonat	1050 mg	8076,92 mg
Kalijum-hlorid	750 mg	5769,23 mg

Hranljiva i energetska vrednost	1 kesica (13 g)	100 g
Energija	170 kJ/40 kcal	1307,64 kJ/307,68 kcal
Masti	0,00 g	0,00 g
od kojih: zasićene masne kiseline	0,00 g	0,00 g
Ugljeni hidrati	10,00 g	76,92 g
od kojih: šećeri (glukoza)	10,00 g	76,92 g
Proteini	0,00 g	0,00 g
So	1,20 g	9,23 g

Sadržaj gotovog rastvora:

Na ⁺	66 mmol/L
K ⁺	20 mmol/L
Cl ⁻	60 mmol/L
HCO ₃ ⁻	25 mmol/L
glukoza	111 mmol/L
osmolalitet	282 mosmol/L
energetska vrednost	340 kJ/80 kcal

Dejstvo i primena

Rastvor Orosal® 65 se koristi kod lakog i srednje teškog stepena dehidracije dece i odraslih sa prolivom i/ili povraćanjem. Daje se u malim porcijama (kašičicom ili na gutljaj iz flašice, odnosno šolje). Povraćanje nije prepreka za primenu proizvoda Orosal® 65 i obično prestaje tokom rehidracije.

Prema stepenu dehidracije, odojče i malo dete treba da uzima Orosal® 65 u dozi od 50-100 ml/kg telesne mase tokom 4-6 sati. U poslednja 2 sata rehidracije daje se voda, a odojčetu i majčino mleko u količini od 50 ml/kg telesne mase. Ukoliko stanje normalne hidracije nije uspostavljeno, postupak se ponavlja na 6 sati po istom principu.

Priprema: sadržaj kesice rastvoriti u 500 ml prokuvane prokuvane i na sobnoj temperatuti ohlađene vode. Pripremljen rastvor upotrebljiv je 24 časa.

Napomena

Proizvod nije pogodan za upotrebu kao jedini izvor hrane. Proizvod ne treba koristiti bez konsultacije sa svojim lekarom.

Upozorenja

Orosal 65® ne smeju koristiti osobe sa:

- Smanjenom funkcijom bubrega
- Povišenom koncentracijom kalijuma u krvi
- Alkalozom

Bolesnici sa visokim krvnim pritiskom, srčanom slabošću, otocima i šećernom bolešću, za nadoknadu tečnosti i elektrolita, mogu koristiti rastvor Orosal® 65, samo pod nadzorom lekara.

Kod bolesnika sa poremećajem gutanja (povrede i oboljenja centralnog nervnog sistema i dr.), Orosal® 65 se može dati sondom.

Proizvod nije za parenteralnu upotrebu.

Način čuvanja

Čuvati na temperaturu do 25° C u originalnom pakovanju, na suvom mestu.
Čuvati van domaćaja dece.

Rok upotrebe

Ne sme se koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

Pakovanje

kesica (13 g)

Orosal® 65 je napravljen u saradnji sa prof. dr Nedeljkom Radlovićem i prof. dr Raškom Stepanovićem

Proizvodač i nosilac upisa u bazu podataka Ministarstva zdravlja Republike Srbije:
Galenika a.d., 11080 Beograd, Batajnički drum b.b.

