

Orosal® 65, prašak za pripremu rastvora za oralnu upotrebu

Dijetetski proizvod - hrana za posebne medicinske namene

Orosal® 65 je napravljen u saradnji sa prof. dr Nedeljkom Radlovićem i prof. dr Raškom Stepanovićem

Orosal® 65, prašak za pripremu rastvora za oralnu upotrebu je dijetetski proizvod - hrana sa posebnom medicinskom namenom sa glukozno-elektrolitnim rastvorom, namenjena za potrebe ishrane/rehidracije dece i odraslih, u lakšim i srednje teškim oblicima dijareja, kao i u drugim stanjima praćenim povećanim potrebama za vodom i elektrolitima, npr. teške opekotine, priprema bolesnika za rendgenska i endoskopska ispitivanja debelog creva i drugo.

Sastav aktivnih komponenti	1 kesica (6,5 g)	% NRV*	100 g
Glukoza	5,0 g	-	76,92 g
Natrijum-hlorid (NaCl)	600,0 mg	-	9,23 g
Natrijum-hidrogenkarbonat (NaHCO ₃)	525,0 mg	-	8,08 g
Kalijum-hlorid (KCl)	375,0 mg	-	5,77 g

*NRV – nutritivna referentna vrednost

Sastojci: glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-hidrogenkarbonat, kalijum-hlorid.

Nutritivne informacije:	1 kesica (6,5 g)	100 g
Energetska vrednost (kJ / kcal)	85,0 / 20,0 kcal	1.307,6 / 307,7
Masti – ukupno (g)	0,0	0,0
od toga zasićene masne kiseline (g)	0,0	0,0
Ugljeni hidrati – ukupno (g)	5,0	76,9
od toga šećeri (g)	5,0	76,9
Proteini (g)	0,0	0,0
So (g)	0,6	9,2

Sastav gotovog rastvora	mmol/l
Na ⁺	33 mmol/l
K ⁺	10 mmol/l
Cl ⁻	30 mmol/l
HCO ₃ ⁻	12,5 mmol/l
Glukoza	55,5 mmol/l
Osmolalitet	141 mosmol/l

Upotreba:

Deca uzrasta iznad mesec dana i odrasli: Sadržaj kesice rastvoriti u 250 ml prokuvane vode, prohladene na sobnoj temperaturi. Pripremljen rastvor je pogodan za upotrebu narednih 24 časa.

Pripremljen rastvor **Orosal® 65** se koristi kod lakog i srednje teškog stepena dehidracije dece i odraslih sa prolivom i/ili povraćanjem. Daje se u malim porcijama (kašičicom ili na gutljaj iz flašice/šolje). Povraćanje nije prepreka za primenu proizvoda i ono obično prestaje tokom rehidracije.

Prema stepenu dehidracije, odojče i malo dete treba da uzima **Orosal® 65** u dozi od 50-100 ml/kg telesne mase u toku 4-6 sati. U poslednja 2 sata rehidracije se daje voda, a odojčetu i majčino mleko u količini od 50 ml/kg telesne mase. Ukoliko nije uspostavljeno stanje normalne hidracije, postupak se ponavlja na 6 sati po istom principu.

Napomene:

Proizvod nije pogodan za upotrebu kao jedini izvor hrane za osobe kojima je namenjen. Čuvati van domašaja dece.

Upozorenja:

Preporučena dnevna doza se ne sme prekoračiti.

Proizvod ne smeju da koriste osobe preosetljive na bilo koji sastojak proizvoda.

Proizvod nije namenjen osobama sa smanjenom funkcijom bubrega, povišenom koncentracijom kalijuma u krvi i sa alkalozom.

Osobe sa povišenim krvnim pritiskom, srčanom slabošću, otocima i šećernom bolešću, za nadoknadu tečnosti i elektrolita, mogu koristiti ovaj rastvor samo pod nadzorom lekara.

Kod osoba sa poremećajem gutanja (povrede i oboljenja centralnog nervnog sistema i dr.), proizvod se može primeniti sondom.

Proizvod se mora koristiti pod medicinskim nadzorom.

Proizvod nije namenjen za parenteralnu upotrebu.

Način čuvanja:

Čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage, na temperaturi do 25 °C.

Rok upotrebe

Ne sme se koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

Pakovanje

5 kesica sa po 6,5 g praška za pripremu rastvora za oralnu upotrebu

Proizvedeno u Republici Srbiji.

Nosilac upisa u bazu podataka Ministarstva zdravlja Republike Srbije:

Galenika a.d., Batajnički drum b.b., 11080 Beograd, Republika Srbija

 Galenika