

Flonivin® Boulardii, kapsule

Dodatak ishrani

Flonivin® Boulardii, kapsule je dodatak ishrani sa 10 milijardi korisnih mikroorganizama *Saccharomyces boulardii*, cinkom i vitaminom D3, namenjen normalnoj funkciji imunog sistema.

Vitamin D i cink doprinose normalnoj funkciji imunološkog sistema. Cink doprinosi zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.

Sastav aktivnih komponenti	1 kapsula	% NRV*	100 g
Liofilizovana kultura korisnih mikroorganizama <i>Saccharomyces boulardii</i>	500 mg (10x10 ⁹ CFU**)	-	75,1 g
Cink (cink-oksidi emulgovani prašak)	10 mg	100	1,5 g
Vitamin D3 (holekalciferol)	25 µg	500	3,8 mg

*NRV – nutritivna referentna vrijednost

**CFU – broj bakterija koje formiraju koloniju

Sastojci

Saccharomyces boulardii, hidroksipropil-metilceluloza (zgušnjivač), titan-dioksid i žuti oksid gvožđa (boje), cink-oksidi, holekalciferol, magnezijum-stearat (sredstvo protiv zgrudnjavanja).

Nutritivne informacije	1 kapsula (0,665 g)	100 g
Energetska vrijednost (kJ / kcal)	11 / 3	1.671 / 397
Masti – ukupno (g)	< 0,5	5,7
od toga zasićene masne kiseline (g)	< 0,1	5,7
Ugljeni hidrati – ukupno (g)	< 0,5	56
od toga šećeri (g)	0	0
Vlakna (g)	< 0,5	17
Proteini (g)	< 0,5	23
So (g)	0	0

Način primjene

Odrasli i deca uzrasta iznad 12 godina: Jednom dnevno popiti jednu kapsulu, bez žvakanja i uz dovoljnu količinu vode.

Napomene

Dodatak ishrani nije zamjena za uravnoteženu, raznovrsnu ishranu i zdrav način života.

Čuvati van domašaja djece.

Upozorenja

Preporučena dnevna doza se ne smije prekoračiti.

Proizvod ne smiju da koriste osobe preosetljive na bilo koji sastojak proizvoda.

Proizvod nije namjenjen mlađima od 12 godina, osobama sa čirom na želucu i dvanaestopalačnom crevu, kao ni osobama sa hiperkalcemijom i hiperparatireoidizmom.

Osobe na terapiji antimikoticima ne treba da koriste **Flonivin® Boulardii, kapsule**, zbog mogućeg izostanka terapijskog dejstva.

Primjena proizvoda sa *Saccharomyces boulardii* se ne preporučuje kod imunokompromitovanih osoba, osoba na imunosupresivnoj terapiji, uključujući i pacijente sa alograftom, neposredno nakon hirurških operacija, kod osoba sa krvavom dijarejom, kao i kod osoba sa centralnim venskim kateterom.

Trudnice i dojilje mogu da koriste ovaj proizvod samo po nalogu svog lekara.

Potreban je oprez kod osoba koje uzimaju tiazide, kardi tonične glikozide, rifampicin, izoniazid, fenitoin i barbiturate.

Istovremena primena sa kortikosteroidima može dovesti do smanjenja dejstva ovog proizvoda.

Proizvod se mora koristiti pod nadzorom ljekara!

Nije namenjeno za parenteralnu upotrebu.

Način čuvanja

Čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage, na temperaturi do 25 °C.

Rok upotrebe

Ne smije se koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

Pakovanje

10 kapsula

Zemlja porijekla: Republika Srbija

Rješenje FMZ BiH broj: 04-33-3602/22-DP od 30.06.2022.

Rješenje MZSZ RS broj: 11/08-500.4-92/22 od 23.05.2022.