

Flonivin® plus kapsule

Dodatak ishrani

Sastav aktivnih komponenti	1 kapsula	2 kapsule	3 kapsule	% NRV* (3 kapsule)	100 g
<i>Saccharomyces boulardii</i> i <i>Bifidobacterium bifidum</i>	najmanje 5 x 10 ⁹ cfu	najmanje 1 x 10 ¹⁰ cfu	najmanje 1,5 x 10 ¹⁰ cfu	/	najmanje 1,6 x 10 ¹² cfu
Cink (cink-acetat)	5,0 mg	10,0 mg	15,0 mg	150	1,60 g

* NRV – nutritivna referentna vrijednost

Sastojci: *Saccharomyces boulardii*; kukuruzni skrob; zgušnjivač: hidroksipropilmetilceluloza; *Bifidobacterium bifidum*; cink-acetat; sredstva protiv zgrudvavanja: talk, silicijum-dioksid; boje: titan-dioksid, brilijant plava FCF

Nutritivne informacije	1 kapsula (0,31 g)	100 g
Energetska vrijednost (kJ/kcal)	1,62 / 0,38	517 / 125
Masti – ukupno (g)	0,00	0,0
od toga zasićene masne kiseline (g)	0,00	0,0
Ugljeni hidrati - ukupno (g)	0,07	21,2
od toga šećeri (g)	0,00	0,0
Proteini (g)	0,00	0,0
So (g)	0,00	0,0

Flonivin® plus kapsula sadrži najmanje 5 milijardi korisnih ćelija (*Saccharomyces boulardii* i *Bifidobacterium bifidum*) i 5 mg cinka.

Cink doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema.

Ćelije korisnih sojeva mogu da se definišu kao mono ili mješovita kultura živih mikroorganizama. Crijeva naseljava oko 100 triliona „prijateljskih“ bakterija, pri čemu 95% pripada bakterijama mliječne kiseline, koje su neophodne za odvijanje osnovnih fizioloških i biohemijskih procesa u čovječjem organizmu.

Većinom su to bakterije mliječne kiseline koje pripadaju sljedećim rodovima nesporogenih bakterija: *Lactobacillus*, *Bifidobacterium*, *Leuconostoc*, *Pediococcus*, *Lactococcus*, *Enterococcus* i *Streptococcus*, sporogene bakterije *Bacillus* sp, kao i neki sojevi gljivica *Saccharomyces* sp.

Flonivin® plus kapsule su kombinacija dvije kulture *Saccharomyces boulardii* i *Bifidobacterium bifidum*. Sojevi su otporni na kiselu sredinu želuca i na žučne soli. *Saccharomyces boulardii* posjeduje prirodnu rezistenciju na antibiotike.

Dejstvo

Korisne ćelije proizvoda Flonivin® plus kapsule naseljavaju sluzokožu crjeva.

Način primjene

Odrasli i djeca iznad 3 godine: Popiti 1-3 kapsule dnevno, bez žvakanja i uz dovoljnu količinu tečnosti.

Napomena

Dodatak ishrani nije zamjena za uravnoteženu ishranu.

Upozorenje

Preporučena dnevna doza se ne smije prekoračiti.

Proizvod ne smiju da koriste osobe preosjetljive na bilo koji sastojak proizvoda.

Kada se proizvod Flonivin[®] plus, kapsule uzima uz oralnu antibiotsku terapiju, treba ga uzeti 2 sata poslije primenjene doze antibiotika.

Primjena proizvoda se ne preporučuje kod osoba nakon hirurških operacija, kod imunokompromitovanih osoba, osoba na imunosupresivnoj terapiji, uključujući i pacijente sa alograftom, kod osoba sa krvavom dijarejom, sa oboljenjima jetre, kao i kod osoba sa centralnim venskim kateterom.

Trudnice, dojilje, kao i osobe koje boluju od kancera i poremećaja digestivnog trakta Flonivin[®] plus kapsule mogu koristiti uz prethodnu konsultaciju sa svojim ljekarom.

Interakcije sa lijekovima

Cink može da smanji terapijski efekat tetraciklina (npr. doksiciklina) i hinolona (npr. ciprofloksacina). Da bi se izbjegle interakcije lijekova i cinka, Flonivin[®] plus kapsule treba uzimati najmanje 2 sata prije ili poslije uzimanja navedenih lijekova.

Način čuvanja

Čuvati na temperaturi do 25 °C u originalnom pakovanju, zaštićeno od svjetlosti i vlage.

Čuvati van domašaja djece.

Rok upotrebe

Ne smije se koristiti poslije isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

Pakovanje

10 kapsula

Proizvođač: Galenika a.d., Batajnički drum b.b., 11080 Beograd, Republika Srbija

Zemlja porijekla: Republika Srbija

Rješenje FMZ BiH broj: 04-37-5943/19-DP od 24.03.2020.

Rješenje MZ RS broj: 11/08-500.4-182/20 od 24.08.2020.

/ Galenika logo /