

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Hepalpan
300 i.j./g krem
heparin

*Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo!
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.
Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.*

Uputstvo sadrži:

1. Šta je lijek Hepalpan krem i za što se koristi
2. Prije nego počnete koristiti lijek Hepalpan krem
3. Kako koristiti lijek Hepalpan krem
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati lijek Hepalpan krem
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK HEPALPAN KREM I ZA ŠTO SE KORISTI

Hepalpan 300 i.j./g krem
1 g krema sadrži: heparin-natrijuma 300 i.j.

Heparin-natrijum nakon resorpcije sprječava zgrušavanje krvi i tako djeluje preventivno protiv nastajanja ugrušaka u krvnim sudovima i terapijski na već nastale ugruške.

Hepalpan krem se upotrebljava kod oboljenja vena kao što su: tromboflebitis (zapaljenje vena povezano sa stvaranjem tromba), proširene vene i posljedične promjene na koži, ulcus cruris (otvorene rane na koži potkoljenica usljed loše venske cirkulacije).

Može se koristiti i kod sportskih povreda (kao što su podlivi, iščašenja i uganuća) i kod oboljenja kao što su burzitis i tenovaginitis (zapaljenje omotača tetiva).

2. PRIJE NEGO POČNETE KORISTITI LIJEK HEPALPAN KREM

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosjetljivi ste na neke od lijekova ili ste imali alergijsku reakciju na neki od njih.

• Nemojte koristiti lijek Hepalpan krem

Ne koristite Hepalpan krem ukoliko ste alergični na neku od sastavnih komponenti lijeka. Krem nemojte nanositi na velike površine kože, ispucalu kožu, osjetljive površine.

Hepalpan krem nemojte nanositi na inficirane površine, sluznice i otvorene rane.

Ukoliko niste sigurni da li se nešto od gore navedenog odnosi na Vas obratite se ljekaru ili farmaceutu.

• Budite oprezni s lijekom Hepalpan krem

Prilikom primjene krema koji sadrži heparin, kod pacijenata sa tromboflebitisom, krem ne utrljavati masažom.

Vodite računa da lijek ne dospije u kontakt sa sluzokožom očiju. Može se nanositi samo na kožu.

Ukoliko niste sigurni da li se nešto od gore navedenog odnosi na Vas obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

• Uzimanje drugih lijekova s lijekom Hepalpan krem

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne koristite, kao i na lijekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Nisu poznate klinički značajne interakcije. Međutim, ukoliko se lijek primjenjuje istovremeno sa drugim preparatima koji se nanose na kožu savjetuje se poseban oprez.

• Uzimanje hrane i pića s lijekom Hepalpan krem

Hrana ili piće nemaju uticaj na dejstvo lijeka Hepalpan krem.

• Trudnoća i dojenje

S obzirom da ne postoje klinički podaci o dejstvima na majku i dijete, Hepalpan krem primjenjivati samo uz savjet i nadzor ljekara.

Prije nego što počnete da koristite neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

- **Upravljanje vozilima i mašinama**

Hepalpan krem ne utiče na psihofizičke sposobnosti upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.

- **Ostala upozorenja**

Šta morate znati o pomoćnim supstancama koje sadrži lijek Hepalpan krem

Heparin sprječava stvaranje krvnog ugruška (tromba) unutar krvnog suda.

Metil-parahidroksibenzoat (E218) može izazvati alergijske reakcije na koži, trenutno ili odgođeno.

3. KAKO KORISTITI LIJEK HEPALPAN KREM

Ukoliko mislite da lijek Hepalpan krem suviše slabo ili jako djeluje na Vaš organizam, treba da se obratite se svom ljekaru.

Lijek Hepalpan krem uzimajte uvijek tačno onako kako je propisano. Ako niste sasvim sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Hepalpan krem se nanosi na oboljelo mjesto kao i na okolnu površinu kože 2-3 puta dnevno i blago utrlja. Kod zapaljenja vena lijek se ne smije utrljavati već se nanosi na oboljelu površinu u tankom sloju. Može se staviti i okluzivni zavoj nakon prethodnog nanošenja krema u debljini od 1 do 2 mm.

Prilikom nanošenja na noge, najbolje je krem nanositi pokretima odozdo naviše tj. u smjeru srca.

Trajanje terapije zavisi od indikacije, najčešće 1-2 nedjelje, a u hroničnim slučajevima i više nedjelja. Dugotrajna upotreba treba da bude pod ljekarskim nadzorom.

Krem ne nanositi na sluzokože, kao ni u blizini sluzokoža.

Kod varikoznih ulceracija (otvorene rane na koži potkoljenica usljed loše venske cirkulacije), krem se nanosi u vidu prstena, širine 4 cm.

Hepalpan krem ne treba primjenjivati kod djece mlađe od 5 godina.

Ukoliko već imate krvne ugruške u venama (trombozu) ili upalu vena (tromboflebitis), ne smijete utrljavati krem na oboljelo mjesto, već ga samo nanijeti u tankom sloju.

- **Ako primijenite više lijeka Hepalpan krem nego što ste trebali**

Ukoliko ste primijenili veću dozu lijeka Hepalpan krem nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa svojim ljekarom ili farmaceutom!

Ukoliko se koristi prema preporukama, nema opasnosti od predoziranja.

- **Ako ste zaboravili uzeti lijek Hepalpan krem**

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili/zaboravili da uzmete lijek!

Nanesite lijek Hepalpan krem kada se sjetite.

Nemojte nanijeti duplu dozu da nadomjestite propuštenu.

- **Ako prestanete koristiti lijek Hepalpan krem**

Nije primjenjivo.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka Hepalpan krem obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi i lijek Hepalpan krem može izazvati nuspojave.

Lijek Hepalpan krem, kao i drugi lijekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Pri pravilnoj upotrebi Hepalpan krem se dobro podnosi. Mogu da se jave svrab, crvenilo i peckanje na mjestu primjene. U tom slučaju obustavite terapiju. Heparin-natrijum može tokom dugotrajne lokalne primjene izazvati preosjetljivost kože (alergiju).

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK HEPALPAN KREM

Lijek Hepalpan krem čuvati van domašaja i pogleda djece.

Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svjetlosti i vlage.

Poslije prvog otvaranja čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, najduže 28 dana.

Rok upotrebe: 3 godine

Lijek Hepalpan krem se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.

Rok upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Posebne mjere uništavanja neupotrijebljenog lijeka ili ostatka lijeka

Neupotrijebljeni lijek uništiti u skladu sa važećim propisima.

Neupotrijebljeni lijek nemojte bacati u kanalizaciju ili kućni otpad. Pitajte farmaceuta za najbolji način odlaganja neupotrijebljenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE

- **Šta lijek Hepalpan krem sadrži**

Sadržaj aktivnih supstanci:

1 g krema sadrži 300 i.j. heparin-natrijuma.

Sadržaj pomoćnih supstanci:

dekspantenol; parafin bijeli, meki; alantoin; lanolin; sorbitanoleat; glicerol; metil-parahidroksibenzoat (E218); voda, prečišćena

- **Kako lijek Hepalpan krem izgleda i sadržaj pakovanja**

Izgled:

Homogen krem blijedožute boje, karakterističnog mirisa.

Pakovanje:

Tuba sa 40 g krema u složivoj kutiji.

- **Režim izdavanja**

Lijek se izdaje bez ljeakarskog recepta.

Proizvođač

GALENKA a.d. Beograd, Batajnički drum b.b., Beograd, Republika Srbija

Proizvođač gotovog lijeka

GALENKA a.d. Beograd, Batajnički drum b.b., Beograd, Republika Srbija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet

GALENKA d.o.o., Vidovdanska b.b., Banja Luka, BiH

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet:

04-07.3-2-7022/19 od 26.02.2020.