

Flonivin® Boulardii (Флонивин® Буларди), капсули

Диететски производ – храна со посебна нутритивна употреба

Flonivin® Boulardii, капсулите се храна со посебна нутритивна употреба со 10 милијарди корисни микроорганизми *Saccharomyces boulardii*, цинк и витамин Д3, наменети за потребите за исхрана на лица со недостаток на цинк, хиповитаминоза на витамин Д, лица со акутна и патничка дијареа, дијареа предизвикана од антибиотици, кај стандардна терапија на инфекција со Хеликобактер пилори, воспалителна болест на цревата (Кронова болест, улцеративен колитис) и синдром на "нервно црево", при терапија на инфекција со бактеријата *Clostridium difficile*, како помош во регулирањето на цревната микрофлора, кај луѓе со ослабен и нарушен имунитет склони кон чести инфекции, како и кај луѓе со други нарушувања и состојби за кои е потребна надокнада на витамин Д3 и цинк.

Состав на активни компоненти	1 капсула	% НРВ*	100 g
Лиофилизирана култура на корисни микроорганизми <i>Saccharomyces boulardii</i>	500 mg (10x10 ⁹ CFU**)	-	74 g
Цинк (цинк оксид емулгиран прашок)	10 mg	100	1,5 g
Витамин Д3 (холекалциферол)	25 µg	500	3,7 mg

*НРВ – нутритивна референтна вредност

**CFU – број на бактерии кои формираат колонија

Состојки

Saccharomyces boulardii, хидроксипропил метилцелулоза (згуснувач), цинк оксид, холекалциферол, магнезиум стеарат (средство против згрутчување).

Употреба

Возрасни и деца постари од 12 години: Еднаш дневно да се испие една капсула, без цвакање и со доволна количина вода.

Забелешки

Производот е нутритивно нецелосна храна и не е погоден за употреба како единствен извор на храна за лицата за кои е наменет.

Да се чува далеку од дофат на деца.

Предупредувања

Препорачаната дневна доза не треба да се надминува.

Производот не смее да се користи од лица преосетливи на која било состојка во производот.

Производот не е наменет за лица под 12 годишна возраст, лица со чир на желудникот или дванестопалачното црево, како и лица со хиперкалцемија и хиперпаратироидизам.

Лицата кои се на терапија со антимиотици не треба да користат *капсули Flonivin® Boulardii*, поради можно отсуство на терапевтски ефект.

Употребата на производи со *Saccharomyces boulardii* не се препорачува кај имунокомпромитирани лица, лица на имunosупресивна терапија, вклучително и пациенти со алогофт, непосредно по операцијата, кај лица со крвава дијареа, како и кај лица со централен венски катетер.

Бремените жени и доилки можат да го користат овој производ само по препорака од нивниот лекар.

Треба да се внимава кај лица кои земаат тиазиди, кардиотонични гликозиди, рифампицин, изонијазид, фенитоин и барбитурати.

Истовремена употреба со кортикостероиди може да го намали ефектот на овој производ.

Производот мора да се користи под медицински надзор.

Не е наменет за парентерална употреба.

Начин на чување

Да се чува во оригиналното пакување, заштитено од светлина и влага, на температура до 25 °C.

Рок на употреба

Не смее да се употребува по истекот на рокот на употреба назначен на пакувањето.

Пакување

10 капсули

Произведено во Република Србија.