

Orosal® 65, прашок за подготовка на раствор за перорална употреба

Додаток на исхрана – храна за посебна нутритивна употреба

Orosal® 65 е направен во соработка со проф. др Недељко Радловиќ и проф. др. Рашко Степановиќ

Orosal® 65, прашок за подготовка на раствор за перорална употреба е диететски производ – храна за посебна нутритивна употреба со глукозно-електролитен раствор, наменет за потребите за исхрана/рехидратација на деца и возрасни, во лесни и средно тешки форми на дијареа, како и во други состојби следени со зголемени потреби за вода и електролити, на пр. тешки изгореници, подготовка на болниот за рендген и ендоскопски испитувања на дебелото црево и друго.

Состав на активните компоненти	1 ќесичка (6,5 g)	% НРВ*	100 g
Глукоза	5,0 g	-	76,92 g
Натриум хлорид (NaCl)	600,0 mg	-	9,23 g
Натриум хидрогенкарбонат (NaHCO ₃)	525,0 mg	-	8,08 g
Калиум хлорид (KCl)	375,0 mg	-	5,77 g

*НРВ – нутритивна референтна вредност

Состав: глукоза, натриум хлорид, натриум хидрогенкарбонат, калиум хлорид.

Нутритивни информации:	1 ќесичка (6,5 g)	100 g
Енергетска вредност (kJ / kcal)	85,0 / 20,0 kcal	1.307,6 / 307,7
Масти – вкупно (g)	0,0	0,0
од тоа заситени масни киселини(g)	0,0	0,0
Јаглехидрати – вкупно (g)	5,0	76,9

од тоа шеќери (g)	5,0	76,9
Протеини (g)	0,0	0,0
Сол (g)	0,6	9,2
Состав на готовиот раствор	mmol/l	
Na ⁺	33 mmol/l	
K ⁺	10 mmol/l	
Cl ⁻	30 mmol/l	
HCO ₃ ⁻	12,5 mmol/l	
Глукоза	55,5 mmol/l	
Осмолалитет	141 mosmol/l	

Употреба:

Деца на возраст над еден месец и возрасни: Содржината на ќесичката растворете ја во 250 ml превриена вода, оладена на собна температура. Подготвениот раствор е погоден за употреба во следните 24 часа.

Подготвениот раствор **Orosal® 65** се употребува кај лесен до средно тежок степен на дехидратација кај деца и возрасни со пролив и/или повраќање. Се дава во мали порции (со лажичка или со голтка од шише/чаша). Повраќањето не е пречка за употреба на производот и тоа вообичаено престанува во тек на рехидратацијата.

Според степенот на дехидратација, доенчињата и мали деца треба да земаат **Orosal® 65** во доза од 50-100 ml/kg телесна тежина во тек на 4-6 часа. Во последните 2 часа на рехидратацијата се дава вода, а на доенчето и мајчино млеко во количина од 50 ml/kg телесна тежина. Доколку не е воспоставена состојба на нормална хидрација, постапката се повторува на 6 часа на истиот начин.

Забелешки:

Производот не е соодветен за употреба како единствен извор на храна за лицата на кои им е наменет.

Да се чува далеку од дофат на деца.

Предупредувања:

Препорачаната дневна доза не смее да се надминува.

Производот не смеат да го користат лица преосетливи на која било состојка на производот.

Производот не е наменет за лица со намалена функција на бубрезите, зголемена концентрација на калиум во крвта и со алкалоза.

Лицата со висок крвен притисок, срцева слабост, отоци и шеќерна болест, за надоместување на течности и електролити, може да го користат овој раствор само под надзор на доктор.

Кај лицата со нарушено голтање (повреда и заболување на централниот нервен систем и др.), производот може да се употреби преку сонда.

Производот мора да се употребува под медицински надзор.

Производот не е наменет за парентерална употреба.

Начин на чување:

Да се чува во оригиналното пакување, заштитено од светлина и влага, на температура до 25 °C.

Рок на употреба

Не смее да се употребува по истекот на рокот на употреба означен на пакувањето.

Пакување

5 ќесички со по 6,5 g прашок за подготовка на раствор за перорална употреба

Произведено во Република Србија.

Застапник:

ГАЛЕНИКА ДООЕЛ Скопје, Булевар Кочо Рацин бр.14, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

 **Galenika**

